

RECHERCHE DU COVID 19 SUR PRELEVEMENT SALIVAIRE (CAMPAGNE DE DEPISTAGE)

POUR LES PATIENTS MINEURS : Le laboratoire considère que le recueil est réalisé avec accord préalable du parent ou du représentant légal.


RECEPTION DES RESULTATS : Nous vous rappelons que vous serez destinataires des résultats. En aucun cas l'établissement n'en sera destinataire.

PROTOCOLE DE RECUEIL DE LA SALIVE :

Le recueil de salive ne doit pas être effectué après un effort de toux (pas de raclement de gorge), il doit être uniquement composé de salive.

A jeun ou sans avoir mangé, ni bu, ni fumé depuis 30 minutes :

- o **Se laver les mains.**
- o Fermer la bouche.
- o Remuer la langue pendant 5 secondes.
- o Cracher dans le pot.



- o Recommencer l'opération 4 fois minimum afin d'atteindre environ 1 cm au fond du flacon.
- o Bien fermer le flacon.
- o Désinfecter l'extérieur du flacon avec la lingette ou une solution antiseptique
- o **Se laver à nouveau les mains.**
- o Identifier le flacon et cette fiche de prélèvement
- o Placer le flacon dans le sachet et le fermer hermétiquement.
- o Puis placer le tout dans le sachet zippé avec la fiche de prélèvement.



Fiche de Prélèvement

Les cases en rouge sont obligatoires, même si le patient est connu

PATIENT

Nom :

Nom de naissance :

Prénom :

Date de naissance : / /

Sexe : Masculin Féminin

Adresse :

CP / Ville : -

Tél / Port :

.....

Mail :

TIERS PAYANT

N° SS :

Caisse :

Mutuelle :

Si le patient n'est pas l'assuré :

Nom :

Prénom :

N° SS :

Date de naissance : / /

TRANSMISSION DES RESULTATS

Site internet Mail

Retrait au laboratoire Courrier

Copie au médecin traitant :

.....

Renouvellement d'étiquettes : Oui Non

PRELEVEMENT Urgent

Date : / / Heure : h

Prélevé par :

Nom :

Prénom :

CONTROLE RECEPTION AU LABO

facultatif

Heure h Par :

Non-conformité : Oui

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Merci de bien vouloir attester la bonne vérification des points suivants en cochant les cases correspondantes :

Prélèvement réalisé plus de 30 minutes après la dernière prise de boisson, d'aliment, de cigarette / e-cigarette, d'un brossage des dents ou d'un rinçage buccodentaire.

Prélèvement réalisé sans effort de toux ni de raclement de gorge et recueilli après avoir « salivé » plusieurs fois pendant 30 secondes dans la bouche pour générer un certain volume (entre 1 à 2 mL).